

Neue Entwicklungen bei Medikamenten

Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik,
Universitätsspital (USB)

Donnerstag, 20.10.2016

M. Parkinson Symptome

Motorische Symptome

- Zittern (Tremor)
- Akinese (verlangsamte und verminderte Bewegung)
- Rigor (Muskelsteifigkeit)
- Störung der Gang- und Standstabilität
- „Freezing“

Nicht Motorische Symptome

- Sensorische Störungen
- Schlafstörungen (REM)
- Tages-Schläfrigkeit
- Verlust des Riechvermögens
- Depressive Verstimmung
- Konzentration- und Gedächtnisstörungen
- Autonomes Nervensystem (e.g. Blasenentleerung, Orthostase, Konstipation)

Medikamentöse Behandlung des M. Parkinson (1/2)

- L-DOPA (mit Enzym-Hemmer)
 - Stalevo (R) kombiniert L-dopa + COMT
- Dopaminagonisten
 - Ropinirol, Pramipexol, Rotigotin (patch)
Bromocriptin, Apomorphin, etc.
- COMT Inhibitoren
 - Entacapone, Tolcapon (Zentral)
- MAO-B Inhibitoren
 - Selegilin, Rasagilin, Safinamide
- Anticholinergika
 - Biperiden
- Glutamatantagonisten
 - Amantadin

Medikamentöse Behandlung des M. Parkinson (2/2)

■ Therapie der Schlafstörungen

- Nächtliche Off-Phasen, frühmorgendliche Akinese: retardierte L-Dopa, Retard Dopaminagonist
- Durchschlafstörung, Insomnie: Mirtazapin , REM-Schlaf-Verhaltensstörung: Clonazepam

■ Depressive Verstimmung

- Diverse Anti-depressiva

■ Parkinson Psychose, Halluzinationen

- Adaptierung dopaminerge Medikation , u.U. Atypische Neuroleptika

■ Parkinson Demenz

- Acetylcholinesterase inhibitor (Rivastigmin)

■ Therapie der Obstipation

- Steigerung der Einnahme von Flüssigkeiten und Ballaststoffe. u..U Polyethylenglykol (Macrogol)

■ Sialorrhö (Erhöhter Speichelfluss)

- Optimierung der dopaminergen Therapie, Anticholinergica wenn verträglich , lokale Injektionen von Botulinum-Toxin in die Speicheldrüsen

■ Blasenfunktionstörung (Dranginkontinenz)

- Trospiumchlorid, Darifenacin, Solifenacin

■ Störung männlicher Sexualfunktion

- Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil

Pipeline M. Parkinson 2016 (Auswahl)

